

Cách chọn và chăn nuôi lợn nái

Người tổng hợp: Phạm Nguyễn Ngọc

Học viện: K7A; FFS-Simacai



Chọn và chăn nuôi Lợn nái

1. *Chọn Lợn cái*

- Thân thon dài, mông vai nở, Lợn có bộ khung-chân to chắc chắn, ngón chân ngắn bước đi vững chãi.
- Mặt thanh, mắt linh hoạt, da mỏng mịn, lông thưa mượt.
- Âm hộ cân đối, không vẹo lệch, không chọn những con hoa nhỏ, tai quắt.
- Hai hàng vú thẳng, khoảng cách các vú đều nhau núm vú không quá to không quá nhỏ, trung bình 14 vú.

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Nuôi dưỡng và chăm sóc

- Từ sau cai sữa đến 5 tháng tuổi cho ăn tự do để Lợn phát triển hết mức.
- Từ 6 tháng tuổi cho ăn theo khẩu phần ăn.
- Tùy theo kinh nghiệm của từng hộ chăn nuôi mà khẩu phần ăn cũng khác nhau.
- Chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng cũng rất khác nhau.

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Bảng 1.1 Định mức thức ăn cho Lợn

Khối lượng Lợn (kg)	Mức ăn/con/ngày	Khối lượng Lợn (kg)	Mức ăn/con/ngày
15-20	0,8	42-45	1,8
25	1,1	46-49	1,9
28	1,2	53	2,0
31	1,3	58	2,1
34-38	1,4-1,5	62	2,2
39-41	1,6-1,7	63-70	2,2
		75-100	2,2

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Nguyên liệu	Đơn vị	Công thức		
		1	2	3
Ngô	%	30		
Cám gạo	%	30		
Đỗ tương	%	0,5		
Bột sừng + vỏ sò, vỏ hến	%	0,25		
Sắn	%	10		
Vitamin tổng hợp	%	0,25		
Rau xanh + Củ, quả	%	15		
Các loại thức ăn phụ khác	%	14		

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Tiêm phòng

- 45 ngày tiêm phòng dịch tả.
- 2 tháng tuổi tiêm tụ huyết trùng.
- 3 tháng tuổi tiêm Leptospirosis 2ml/con.
- 4 tháng tuổi trở lên 3ml/con để phòng Leptospirosis và tiêm 1 số loại vacxin khác

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Phối giống

- Lợn cái đã phát triển thành thực về tính và thể vóc
- Khi Lợn động dục lần hai ta bắt đầu phối giống cho Lợn (không nên phối giống ngay lần động dục đầu tiên vì lúc này Lợn vẫn chưa phát triển hoàn thiện và chưa thực sự sẵn sàng để giao phối).
- Ghi chép lại ngày phối giống (số lần phối, lần phối cuối cùng...)
- Sau khi phối giống và đã xác định được Lợn đã có thai ta chăm sóc và nuôi dưỡng theo khẩu phần ăn của Lợn nái có thai.

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Chăm sóc lợn nái chữa

- Lợn thường chữa 113-116 ngày trung bình 114 ngày
- Trong thực tế chia làm 2 giai đoạn
 1. Chữa kỳ I từ thụ thai đến 84 ngày
 2. Chữa kỳ II trước đẻ một tháng

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Bảng 1.3 Định mức thức ăn cho Lợn nái mang thai

<i>Nhu cầu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Chửa kỳ I</i>	<i>Chửa kỳ II</i>
Mức ăn	Kg	1,3-1,4	1,6-1,7
Lãng lượng chao đôi	Kcal/kg		

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Chế độ vận động

- Gia súc mang thai có chế độ vận động hợp lý không đuổi chạy không vận động quá sức.
- Ở chữa kỳ I bào thai chưa có sự liên kết chặt chẽ với cơ thể mẹ.
- Ở chữa kỳ II do bào thai phát triển chèn ép các cơ quan nội tạng của cơ thể mẹ cũng không nên cho vận động nhiều.
- Khi vận động phải nhẹ nhàng tránh vận động đột ngột

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Chuồng trại

- Đảm bảo các nguyên tắc chung của thiết kế chuồng trại, không ảnh hưởng đến cấu trúc của thiết kế chuồng trại khác.
- Áp dụng triệt để việc tiết kiệm chi phí nhưng tuyệt đối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Chuồng trại phải ẩm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, không khí trong lành, ít bụi, ít độc, hạn chế những yếu tố gây hại cho lợn.
- Chuồng trại phải có sân chơi cho Lợn con, có ổ úm về mùa đông và luôn luôn sạch sẽ.

Chăm sóc Lợn nái đẻ

1. *Phương pháp đỡ đẻ*

- Khi Lợn có biểu hiện rặn đẻ: nên rửa sạch phần thân sau hậu môn, mông, đuôi, sau đó sát trùng bằng Crezin 1% người đỡ đẻ cũng phải sát trùng tay cẩn thận, đi găng tay và quần áo bảo hộ.
- Chuẩn bị thuốc kích thích Lợn đẻ bằng Oxytocin, pitnitrium tiêm dưới da 2-3ml làm cho tử cung co bóp mạnh đẩy thai ra ngoài.
- Trong trường hợp đẻ khó thai quay ở cổ tử cung, thai chết, thai khô hoá, Lợn mẹ rặn mà thai khó ra thì ta phải có biện pháp can thiệp (dùng tay hỗ trợ Lợn mẹ tổng thai ra ngoài).

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

2. Công tác hộ lý sau khi đẻ

- Sau khi thai ra ngoài cần lau, móc hết nhớt trong miệng, lỗ mũi, của con Lợn con tránh Lợn bị ngạt. Đặc biệt mùa lạnh cần lau nhanh để Lợn không bị cảm lạnh.
- Đối với Lợn mẹ dùng nước sinh lý 0,9%, thuốc tím 0,1% lau rửa mép âm môn, rửa bầu vú bằng nước xà phòng ấm, bế Lợn con đến điểm cố định đầu vú và cho bú sữa đầu.
- Khi lợn mẹ sỏ nhau thai cần thu lại không cho ăn để gây ảnh hưởng rối loạn tiêu hoá cho lợn mẹ.

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

2. Công tác hộ lý sau khi đẻ (tiếp)

- Lợn mẹ sau khi đẻ khát nước cần phải cho uống nước sạch pha với muối để tránh hiện tượng sốt sữa.
- Xử lý dây rốn: Vuốt sạch máu về phía Lợn con, sát trùng điểm cắt cách cuống rốn 3-4cm, cắt ở phía ngoài cách nút buộc 1cm.
- Bấm nanh: dùng kim bấm nanh để bấm nanh Lợn con khi lợn vừa sinh ra khỏi lòng mẹ.
- Cắt đuôi Lợn con: Áp dụng cho nhưng trang trại lợn chăn nuôi tập trung.

Chọn và chăn nuôi Lợn nái

Các biện pháp kích thích Lợn động dục

- Lợn nái sau khi cai sữa sẽ được chuyển xuống chuồng chờ phối, để Lợn nái nhanh động dục chuồng chờ phối phải được bố trí ở gần chuồng Lợn đực và cần nhiều ánh sáng.
- Khẩu phần ăn có nồng độ năng lượng cao.
- Ngoài ra dùng huyết thanh ngựa chữa để tiêm cho Lợn nái.

Thank you very much!

